

# Glicerinske svečke za odrasle 1,71 g glicerol

## **Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

## **Kaj vsebuje navodilo**

1. Kaj je zdravilo Glicerinske svečke za odrasle in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Glicerinske svečke za odrasle
3. Kako uporabljati zdravilo Glicerinske svečke za odrasle
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Glicerinske svečke za odrasle
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

## **1. Kaj je zdravilo Glicerinske svečke za odrasle in za kaj ga uporabljamo**

Zdravilo Glicerinske svečke za odrasle vsebuje glicerol, ki deluje kot osmотно odvajalo. Glicerol poveča vsebnost vode v blatu, ga mehča in poveča njegovo drsljivost. Deluje tudi rahlo dražeče na sluznico črevesa in s tem sproži refleks odvajanja.

Glicerinske svečke za odrasle so blago odvajalo in se uporabljajo pri akutnem zaprtju, ko odvajanje blata izostane nekaj zaporednih dni. Odvajalni učinek nastopi hitro, v 15 do 45 minutah.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

## **2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Glicerinske svečke za odrasle**

### **Ne uporabljajte zdravila Glicerinske svečke za odrasle**

- če ste alergični na glicerol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če imate bolečine v trebuhu brez znanega vzroka,
- če imate črevesno zaporo (ileus),
- če imate akutno črevesno vnetje,
- če ste dehidrirani.

### **Obvestila in previdnostni ukrepi**

Pred začetkom uporabe zdravila Glicerinske svečke za odrasle se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pri uporabi zdravila Glicerinske svečke za odrasle bodite posebno pozorni:

- če ste starejši,
- če ste sladkorni bolnik, ker je med uporabo tega zdravila pri vas potrebno spremljati raven glukoze v krvi.

Zdravilo uporabljajte čim krajši čas. Kronično zaprtje poskušajte preprečiti s prilagoditvijo prehranjevalnih navad in življenjskega sloga.

### **Druga zdravila in zdravilo Glicerinske svečke za odrasle**

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni znano, da bi zdravilo Glicerinske svečke za odrasle vplivalo na učinke drugih zdravil. Študij o medsebojnem delovanju z zdravili niso izvedli.

### **Nosečnost in dojenje**

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Zdravilo Glicerinske svečke za odrasle se lahko uporablja med nosečnostjo in dojenjem.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Ni znano, da bi zdravilo Glicerinske svečke za odrasle vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Študij niso izvedli.

### 3. Kako uporabljati zdravilo Glicerinske svečke za odrasle

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek je 1 do 2 svečki dnevno.

Svečko izluščite iz dvojnega traka in jo vstavite globoko v črevo, z zašiljenim delom naprej.

#### Uporaba pri otrocih

Glicerinske svečke za odrasle so namenjene za uporabo pri odraslih in mladostnikih, starejših od 12 let. Za otroke, mlajše od 12 let, je zdravilo na voljo v obliki, ki je namenjena tej starostni skupini.

#### Če ste uporabili večji odmerek zdravila Glicerinske svečke za odrasle, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje lahko povzroči močnejše draženje črevesne sluznice.

#### Če ste pozabili uporabiti zdravilo Glicerinske svečke za odrasle

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

### 4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Po uporabi zdravila Glicerinske svečke za odrasle se v redkih primerih lahko pojavi draženje ali pekoč občutek v rektalnem predelu.

#### Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

### 5. Shranjevanje zdravila Glicerinske svečke za odrasle

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na obojnini poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

### 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

#### Kaj vsebuje zdravilo Glicerinske svečke za odrasle

Učinkovina je glicerol. Ena svečka vsebuje 1,71 g brezvodnega glicerola.

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so prečiščena voda, natrijev karbonat in stearinska kislina.

#### Izgled zdravila Glicerinske svečke za odrasle in vsebina pakiranja

Svečke so mlečno bele barve, zašiljene in valjaste oblike. Škatla vsebuje 10 svečk (2 dvojna trakova s po 5 svečkami, pakirana v vrečice iz laminirane aluminijeve folije).

#### Način in režim izdaje zdravila Glicerinske svečke za odrasle

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

#### Proizvajalec

Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij, Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 5. 12. 2023