

Ihtiolno mazilo

ihtiol 100 mg/g

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Ihtiolno mazilo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Ihtiolno mazilo
3. Kako uporabljati zdravilo Ihtiolno mazilo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Ihtiolno mazilo
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Ihtiolno mazilo in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Ihtiolno mazilo vsebuje ihtiol, ki ima blago protivnetno, protimikrobno in adstringentno delovanje.

Ihtiolno mazilo se uporablja pri zdravljenju kožnih obolenj, kot so ognjki, akne in turi. Na mestu nanosa izboljša prekrvavitev in s tem pripomore k razkrojitvi gnoja iz ognjka.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Ihtiolno mazilo

Ne uporabljajte zdravila Ihtiolno mazilo

- če ste alergični na ihtiol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- na odprtih ranah in sluznicah.

Obvestila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Ihtiolno mazilo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Druga zdravila in zdravilo Ihtiolno mazilo

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni znano, da bi zdravilo Ihtiolno mazilo vplivalo na učinke drugih zdravil. Študij o medsebojnem delovanju z zdravili niso izvedli.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Varnost med nosečnostjo in dojenjem ni bila ugotovljena. Ker ni zadostnih podatkov, se pred uporabo zdravila Ihtiolno mazilo med nosečnostjo in dojenjem posvetujte z zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Ihtiolno mazilo vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Študij niso izvedli.

Zdravilo Ihtiolno mazilo vsebuje lanolin

To zdravilo vsebuje lanolin. Lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3. Kako uporabljati zdravilo Ihtiolno mazilo

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo Ihtiolno mazilo nanesite na ognojek enkrat na dan v debelem sloju in namazani predel prekrijte s sterilno gazo. Ko se ognojek odpre, nanesite zdravilo samo na okolico.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Po uporabi zdravila Ihtiolno mazilo se lahko pojavijo alergijske reakcije na koži, kot so dermatitis, pekoč občutek na koži in draženje kože (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Ihtiolno mazilo

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte v zaprti tubi, pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjne odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Ihtiolno mazilo

Učinkovina je ihtiol. 1 g mazila vsebuje 100 mg ihtiola.

Drugi sestavini zdravila (pomožni snovi) sta beli vazelin in lanolin.

Izgled zdravila Ihtiolno mazilo in vsebina pakiranja

Mazilo je temno rjave barve in značilnega vonja po ihtiolu.

Škatla vsebuje aluminijasto tubo s 25 g mazila.

Način in režim izdaje zdravila Ihtiolno mazilo

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Proizvajalec

Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij, Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 1.8.2024